

## シュアベットⅡ



### ワンステップ酸性クリーナー、除菌剤、除ウイルス・静カビ剤、消臭剤

本製品は洗浄、除菌、消臭をワンステップで行います。石鹼カスや汚れ、水垢、銹物堆積物、石灰石鹼堆積物、硬水による汚れを分解し、身の回りの菌を除菌します。ゴシゴシと磨き洗いをせずに洗浄します。臭気除去も行え、浴室などに新鮮な香りを残します。

#### 特徴：

- ・ 緑膿菌や黄色ブドウ球菌、また化膿連鎖球菌を効果的に除菌します。
- ・ 硬水による堆積物やサビ、銹物汚れ、石灰石鹼堆積物を除去します。
- ・ シャワータイル、ファイバーグラス、クロム、ガラス、便器、シンク、バスタブ等から素早く石鹼カスを除去します。

#### サイズ：

3.8L (1 ガロン)	ボトル 4 本入り	BET 13404
19L (5 ガロン)	ペール缶	BET 31405

#### 使用方法：

##### 希釈倍率

1 ガロン (3.8L) の水に対して原液 4 オンス (120ml) を加えて下さい。(1 : 32)

#### 除菌手順

クロスやスポンジ、スプレーで塗布するか、浸漬することで表面全体を濡らし、10 分間濡れた状態にします。清潔なクロスやスポンジで拭き取るか自然乾燥させます。

スプレーを使用する場合は、粗めのスプレーを使い、表面から 15cm~20cm 離します。スプレーしてからブラシやスポンジ、クロス等で拭き取って下さい。スプレーを吸い込まず、使用後はノズルを閉めて下さい。頑固な汚れの場合には前洗浄が必要になります。希釈液は毎日取り換え、溶液が汚れた場合は交換して下さい。カウンタートップや電化製品、テーブルやレンジ面などの食べ物と接触する可能性がある表面は水ですすぐようにして下さい。本製品は、台所用品やガラス用品、食器等を清掃するためのものではありません。また、本製品はクリティカル/セミクリティカル医療機器に対する滅菌剤や高レベル除菌剤として使用することはできません。ただし、それらの滅菌や高レベル除菌を施す前洗浄としては使用できます。

#### 除ウイルス手順：

前述の除菌手順に従います。塗布した表面を 1 分間濡れた状態にしてください。口蹄疫ウイルスに対しては該当表面との接触時間を 30 秒間設けます。その後自然乾燥させてください。

#### カビ、白カビの抑制手順：

1 ガロン (3.8L) の水に対して原液 3~4 オンス (90~120ml) を希釈して使用することで、硬質で通気性のない表面の臭いやカビを抑制します。表面全体が十分に濡れている状態にし、その後乾燥させます。週に 1 度もしくは臭気が発生した場合は再塗布して下さい。

ヘルスケア現場等において、体液や血液で汚染している硬質無孔表面は、前洗浄をして適切な除菌工程に移ることで、HIV-1 (ヒト免疫不全ウイルス 1 型) に対する効果・効能を発揮します。血液や体液が付着した環境表面・物体に対する HIV-1 (ヒト免疫不全ウイルス 1 型) の除菌に関する注意点：

個人保護：血液や体液で汚染された場所を清掃する場合、使い捨てグローブ、ガウン、フェイスマスク、保護眼鏡を必ず着用して下さい。

**清掃手順：**本製品を塗布する前に、血液及び体液を予め表面や物体から完全に除去して下さい。

**接触時間：**1分間、表面が湿った状態を保って下さい。口蹄疫ウイルスに対しては30秒間、湿った状態を保ちます。その他のバクテリアに対しては10分間の接触時間を設けて下さい。

**感染物質の廃棄：**血液および体液を加圧滅菌器で処理し、国、都道府県、市町村の感染性廃棄物の取り扱い方法に従って破棄して下さい。

**頑固な汚れに対する使用方法：**

原液 240ml を 3.8L の水で希釈して使用して下さい。

**洗浄及び消臭：**

本製品と水を 1:32 の割合で希釈し、表面を完全に濡らすように塗布して下さい。1分以上濡れた状態にし、水ですすいだ後に乾燥させて下さい。

**仕様：**

色：	緑
発泡性：	高い
香り：	シトラス
石灰石鹼の除去：	抜群
pH：	<1.0



**東栄部品株式会社**

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

